Baden-Württemberg
STAATLICHE LEHR- UND VERSUCHSANSTALT FÜR WEIN- UND OBSTBAU WEINSBERG

SAUVITAGE



Klonenbezeichnung: We R 10
Abstammung: FR 147-66 x We 75-34-13
Züchtungsbezeichnung: We 88-101-13



Weinbauliche Eigenschaften



SAUVITAGE ist eine pflegeleichte Qualitätssorte mit sehr senkrechtem Wuchsverhalten. Die Sorte besitzt eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Peronospora und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Oidium („PiWi"-Sorte). Durch den lockeren Traubenaufbau besitzt sie auch eine sehr gute Beständigkeit gegen Traubenfäule. SAUVITAGE zeigt zudem eine hohe Sonnenbrand-Festigkeit und eine sehr gute Holzreife auch in schwierigen Jahren.

Oenologisches Potential – Qualitätsprofil der Weine – Weinstilistik



Weine der Sorte SAUVITAGE zeigen eine exotisch-frische Aromatik mit harmonischem Charakter. Reif-fruchtige Sauvignon blanc-Aromen, wie z.B. Stachelbeeren verbinden sich mit einer meist milden, harmonischen Säure.

Eltern und Abstammung



SAUVITAGE entstammt einer Kreuzung der Elternsorten FR 147-66 und We 75-34-13. Die Kreuzung wurde im Jahr 1988 an der LVWO Weinsberg durchgeführt. Der Zuchtstamm FR 147-66 vereint Erbanteile von Riesling und Grauburgunder mit Resistenzgenen gegen Pilzkrankheiten aus amerikanischen *Vitis*-Arten.
We 75-34-13 ist eine Kreuzung von Sauvignon blanc, Riesling und der asiatischen Rebe *Vitis amurensis.* Letztere besitzt eine hohe Frostfestigkeit, eine sehr hohe Peronospora-Resistenz und begünstigt den lockeren Traubenaufbau.

- Bitte wenden -

Weinbauliche Merkmale und Anbauempfehlungen



Kloneninformation

Bislang eine registrierte Klonenbezeichnung: We R 10

Sortenschutz

Sortenschutzinhaber ist das Land Baden-Württemberg. Der Sortenschutz wurde am 19.02.2020 erteilt.

Praxistipps

Der ideale Lesezeitpunkt zur Förderung der optimalen Aromareife liegt zwischen 85 und 90°Oe.
Eine oenologische Behandlung vergleichbar zu Sauvignon blanc ist empfehlenswert zur Förderung der Sortentypizität.
Die Pflanzenschutzstrategie und –intensität ist entsprechend der guten fachlichen Praxis durchzuführen. Auf Basis unserer Erfahrungen kann die Pflanzenschutzintensität gegen Peronospora und Oidium im Vergleich mit Standardsorten um ca. 70% reduziert werden. Sortenindividuelle Hinweise zu Behandlungszeitpunkten können auf www.vitimeteo.de abgerufen werden.

LVWO Weinsberg, Referat Rebenzüchtung, Traubenplatz 5, 74189 Weinsberg, Deutschland
TEL: +49 (0)7134-504186 FAX: +49 (0)7134-504189, E-MAIL: rebenzuechtung@lvwo.bwl.de